





Anti Medaka Vitellogenin Monoclonal Antibody (Clone No. 3C1)

Package Size 100 μ g(100 μ L/vial)
 Format Mouse monoclonal antibody 1.0mg/mL
 Buffer 10mM sodium phosphate , 0.15M sodium chloride , 1%BSA , pH7.4
 Storage Store below -20°C .
 Once thawed, store at 4°C . Repeated freeze-thaw cycles should be avoided.
 Clone No. 3C1
 Subclass IgG1
 Immunogen source Medaka vitellogenin purified from 17β -estradiol treated serum and ascite.
 Working dilution Immunoblotting 0.01~0.1 μ g/mL ;
 ELISA 0.1~0.5 μ g/mL
 (Fixed quantity system by ELISA has not been established.)
 Specificity <cross reactivity>

	Medaka	Red sea bream	Carp	mummichog
ELISA	(+)	(-)	(-)	(-)
Immunoblotting	(+)	(-)	(-)	(-)



ELISA

Antigen:

Medaka vitellogenin was purified from female serum. Red sea bream and mummichog vitellogenins were purified from male fish induced with 17β -estradiol. Each antigen were diluted to $5\mu\text{g/mL}$ and added to microtiter plate

Primary antibody (3C1) Purified monoclonal antibody


IMMUNOBLOTTING

Sample Plasma(dilution 1:40) from female fish (carp) or male fish induced with 17β -estradiol (red sea bream, mummichog and medaka).

Primary antibody 3C1 diluted $1:10^5$



Anti Medaka Vitellogenin Monoclonal Antibody (Clone No. 3C1)



【References】

1. N.Hiramastu, M.Shimizu, H.Fukada, M.Kitamura, K.Ura, H.Fuda, and A.Hara, (1997) *Comp. Biochem Physiol.* 118C(2) 149-157
2. N.Hiramatsu and A.Hara. (1996) *Comp Biochem Physiol.* 115A(3) 243-251
3. H.Okumura, A.Hara, F.Saeki, T.Todo, S.Adachi and K.Yamauchi,(1995) *Fisheries Science* , 61(2) 283-289
4. T.Matsubara, T.Wada and A.Hara, (1994) *Comp Biochem Physiol.* 109B(4) 545-555
5. Y.Tao, A,Hara, R.. G. Hodson, L. C. Woods III and C. V. Sullivan, (1993) *Fish Physiol. Biochem*, 12(1) 31-46
6. A.Hara, C. V. Sullivan and W.W. Dickhoff,(1993) *Zool. Sci.*, 10(2), 245-256

Distributor



COSMO BIO CO., LTD.
Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

<http://www.cosmobio.co.jp>


e-mail : export@cosmobio.co.jp

Phone : +81-3-5632-9617

FAX : +81-3-5632-9618

抗 メダカビテロジェニン モノクローナル抗体 (Clone No. 3C1)

卵黄前駆蛋白物質であるビテロジェニン(Vg)は、卵生高等脊椎動物の血中に出現するメスに特異的な蛋白質です。Vg はエストロジェン(女性ホルモン)の作用のもとに、通常、卵黄形成期のメス肝臓で合成され、血中を介して卵内に取り込まれ卵黄蛋白質を構成します。また、エストロジェン処理をすることにより、オス血中にも誘導される蛋白質であることから、近年、河川などの環境水中にある内分泌攪乱物質のバイオマーカーとして注目されています。



- 容量 100 μ g (100 μ l/バイアル)
- 形状 マウスモノクローナル抗体 1.0mg/ml 凍結品
- バッファー 0.15M 塩化ナトリウム、10mM リン酸緩衝液(pH7.4)、1%BSA
- 保管方法 -20°C 以下(解凍後は 4°C 、凍結・融解の繰り返しは避けて下さい)
- クローン番号 3C1
- サブクラス IgG1
- 抗原 メダカビテロジェニン
- 使用濃度 イムノブロットイング 0.01~0.1 μ g/ml
ELISA 0.1~0.5 μ g/ml (ELISA 系による定量系は確立されておりません。)
- 特異性 <交差反応性>

	メダカ	マダイ	コイ	マミチヨグ
ELISA	(+)	(-)	(-)	(-)
イムノブロットイング	(+)	(-)	(-)	(-)

抗メダカビテロジェニンモノクローナル抗体(Clonе No. 3C1)

【各魚種のビテロジェニンに対する反応性】

ELISA

抗原:

マダイ、マミチヨグ、メダカの各ビテロジェニンは、 17β -エストラジオールを曝露したオスの血清より精製。コイについてはメス血清より精製。


固相化抗原濃度 $5\mu\text{g/ml}$

イムノブロットイング

抗原:

コイは、1:40に希釈したメスの血漿。

マダイ・マミチヨグ・メダカは、 17β -エストラジオールを曝露したオスの血漿。



1 2 3 4



← Vitellogenin

Sample

1. Red sea bream
2. Carp
3. Mummichog
4. Medaka

【参考文献】

1. N.Hiramastu, M.Shimizu, H.Fukada, M.Kitamura, K.Ura, H.Fuda, and A.Hara, (1997) *Comp. Biochem Physiol.* 118C(2) 149-157
2. N.Hiramatsu and A.Hara. (1996) *Comp Biochem Physiol.* 115A(3) 243-251
3. H.Okumura, A.Hara, F.Saeki, T.Todo, S.Adachi and K.Yamauchi,(1995) *Fisheries Science* , 61(2) 283-289
4. T.Matsubara, T.Wada and A.Hara, (1994) *Comp Biochem Physiol.* 109B(4) 545-555
5. Y.Tao, A.Hara, R.. G. Hodoson, L. C. Woods III and C. V. Sullivan, (1993) *Fish Physiol. Biochem*, 12(1) 31-46
6. A.Hara, C. V. Sullivan and W.W. Dickhoff,(1993) *Zool. Sci.*, 10(2), 245-256



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社