



**For research use only. Not for clinical diagnosis.**

**Catalog No.PMC-SWN-IMS32C**

# Mouse Schwann Cell Line (IMS32)

## Cell specification

Schwann cells are the principal glia cells of the peripheral nervous system (PNS) and are involved in several aspects of PNS biology. In addition to providing trophic support for neuronal development and maintenance through the production of cytokines and growth factors, Schwann cells wrap around axons of motor and sensory neurons to create an insulating myelin sheath that aids impulse conductivity. In recent years, Schwann cells have increasingly known for their support to nerve regeneration while their dysfunction may contribute to Neurodegenerative diseases such as ALS.

IMS32s are spontaneously immortalized cell line established from long term culture of mouse dorsal root ganglia and peripheral nerves. IMS32 cells retain many characteristics of mature Schwann cells and are readily propagated in the supplied media. IMS32 cells can be used to investigate many aspects of neuronal biology including nerve regeneration, neuroprotective mechanisms, and for the development of novel therapeutic approaches to neurological disorders.

## Components

Product Name	Quantity	Amount	Storage Conditions	Stability
Mouse Schwann Cell Line (IMS32), Cryopreserved	5 x 10 <sup>5</sup> cells/vial	1 vial	Liquid nitrogen storage	6months

- ※ Store frozen cells in liquid nitrogen if not ready for use after receipt.
- ※ Based on the license agreement of Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, IMS32 cell are prohibited to provide (distribution, lending, transfer, licensing, etc.) to a third party.

## General Information

<b>Organism</b>	ICR mouse (adult)
<b>Tissue</b>	Dorsal Root Ganglion and Peripheral Nervous System
<b>Cultural Properties</b>	Adherent
<b>Biosafety Level</b>	1
<b>Morphology</b>	Spindle-shaped
<b>Cell Type</b>	Spontaneous Immortalization
<b>Quality Check</b>	Mycoplasma (-), Immunohistochemical reactivity of cell markers

## Optimized Culture Medium (selling separately)

Catalog No.	Product Name	Size	Quantity	Storage Conditions	Expiration date
SWNMM	Schwann Cell (IMS32) Medium	500 mL	1	-20°C Freezer	- Written on the bottle
				4°C	3month after thawing

## Protocols

- ※ This product is available for passage.

### [Thawing Protocol]-for 100mm plastic culture dish

Preparation

- 100mm dish for culturing cells
- Medium for the mouse Schwann cell line (IMS32)



1. Thaw vials of frozen cells by warming them in 37°C warm water for 2 minutes.
2. Transfer the thawed cell solution to a 50 mL centrifuge tube containing 10 mL of medium previously returned to room temperature, mix, and collect the cell solution by 1 mL separating the culture medium in the centrifuge tube and co-washing the vials.
3. Transfer cell suspension to 100mm dish (seeding density: approximately  $0.9 \times 10^4$  cells/cm<sup>2</sup>). Incubate the plate at 37°C under 5% CO<sup>2</sup>

Note: Centrifugation of cells after thawing are not recommended since these actions are more harmful to the cells than the effect of residual cell freezing medium in the culture and cell attachment.

4. Replace the medium with medium heated to 37°C once the day after seeding, and then 2 to 3 times a week.

\*After 3~5 days, IMS32 cells reach approximately 80~100% confluent.

### **[Cell passage Protocol]**

Preparation

- 70-90% confluent cells
- Medium for the mouse Schwann cell line (IMS32)

1. Remove 70-90% confluent cells from the CO<sub>2</sub> incubator.
2. Aspirate the supernatant, add 10-12mL/100mm medium.
3. Detouch the cells by pipetting.  
※ After pipetting, check under a microscope to see if the cells are detached. If pipetting is inadequate, a significant number of cells cannot be detached, and growth may be affected.
4. Collect the cell suspension in a 50mL centrifuge tube.
5. Mix the cell suspension and medium in a ratio of 1:3 to 1:4 and seed it in a new culture vessel.
6. Incubate in a 37°C incubator in the presence of 5% CO<sub>2</sub>. Passage should be performed in the same manner with cells 70-90% confluent (see Figure 1, C).


### **[Freezing Cells Protocol]**

1. Cell passage protocols 1 to 4 are performed.
2. Centrifuge at 4°C for 5 minutes at 200 ×g, remove the supernatant, add COS banker(KOJ product cord COS-CFM01) to  $1 \times 10^6$  cells/mL and suspend.
3. Dispense 1 mL/tube into cryopreservation tubes, and cryopreserve at -80°C by using cell freezing containers (BM-instrument-product-code BCS-136 or equivalent products).
4. Store at -80°C for 1 day or more. Transfer to liquid nitrogen.




## Technical information


A



B



C



### [Immunofluorescence of IMS32 cells]

A: Anti-p75NTR (green), nuclear staining (blue)

B: Anti-s100 (green), nuclear staining (blue)

C: phase-contrast microscopic image

Magnification :  $\times 100$ (A,B,C)

## References

- 1) Watabe K, Fukuda T, Tanaka J, et al. Spontaneously immortalized adult mouse Schwann cells secrete autocrine and paracrine growth-promoting activities. *J Neurosci Res.* 1995;41:279-290.
- 2) Watabe K, Sakamoto T, Kawazoe Y, Michikawa M, Miyamoto K, Yamamura T, Saya H, Araki N. Tissue culture methods to study neurological disorders: Establishment of immortalized Schwann cells from murine disease models. *Neuropathology* 2003;23:64-74.



COSMO BIO Co., LTD.

[JAPAN]

TOYO EKIMAE BLDG. 2-20, TOYO 2-CHOME,  
KOTO-KU. TOKYO 135-0016, JAPAN  
Phone: +81-3-5632-9610  
FAX: 81-3-5632-9619  
URL: <https://www.cosmobio.co.jp/>



COSMO BIO USA

[Outside Japan]

2792 Loker Ave West, Suite 101  
Carlsbad, CA 92010, USA  
email: [info@cosmobioussa.com](mailto:info@cosmobioussa.com)  
Phone/FAX: (+1) 760-431-4600  
URL: [www.cosmobioussa.com](http://www.cosmobioussa.com)



凍結株化細胞製品

# マウスシュワン細胞株 (IMS32)

【 Mouse Schwann Cell Line(IMS32), Code No.SWN-IMS32C 】

本製品は研究目的にのみご使用になれます。

2018年11月28日改訂

## I. 製品概要

シュワン細胞とは、末梢神経の軸索を取り囲む髄鞘を形成・維持する細胞であるとともに、運動・感覚ニューロンの維持に重要なサイトカイン等を産生しています。加えて近年、神経損傷後の軸索再生過程において、シュワン細胞が軸索の誘導や修復等に主要な役割を担っていることが明らかとなってきました。また、シュワン細胞の異常は筋萎縮性側索硬化症 (ALS) の原因因子として注目されています。

IMS32 は、成熟 ICR マウスの後根神経節及び末梢神経組織より樹立された不死化細胞株で、シュワン細胞の各種マーカー及び神経細胞の神経突起伸長の促進等、成熟シュワンの生理・生化学的特徴の多くを有しています。神経再生や脱髄疾患等、神経研究にご活用ください。

## II. 使用前注意事項

本マニュアルを使用前に必ずご確認ください。

本製品はすべて【無菌操作】で実施して下さい。バイオセーフティーレベルは【レベル1】です。

本製品の培養には別売の専用メディアムをご使用下さい。

## III. 製品の保証について

細胞を液体窒素にて正しく保存し、専用メディアム及び試薬を用いてマニュアル通りに培養された場合のみ、培養開始後の増殖不良に関して保証致します。

当社、製品サポート（メール：[primarycell@cosmobio.co.jp](mailto:primarycell@cosmobio.co.jp)）までご連絡下さい。

保証期限は【製品お受け取りから6ヶ月以内】です。

メディアムや使用方法に変更を加えられた場合や、再凍結した細胞を使用された場合は、保証の対象になりませんのでご注意ください。

## IV. 製品構成

構成	容量	本数	保存方法	有効期限
マウスシュワン細胞株 IMS32 (凍結細胞)	5×10 <sup>5</sup> cells/vial	1本	液体窒素保存	6ヶ月

※受け取り後、直ちにご使用にならない場合は凍結細胞を液体窒素にて保存してください

※本製品に関し、公益財団法人 東京都医学総合研究所とのライセンス契約に基づき、自己の研究目的にのみ使用し、細胞の第三者への提供（分配、貸与、譲渡、使用許可等）を禁止します。



## V. 細胞の由来

マウス後根神経節及び末梢神経組織由来 (ICR,adult)

## VI. 専用メディアウム(別売)

品名	品番	容量	保存方法	有効期限
マウスシュワン細胞株 (IMS32) 用メディアウム	SWNMM	500 mL	-20℃保存 (解凍後は4℃保存)	ボトル記載(-20℃保存) 解凍後3ヶ月(4℃保存)

培地の主成分：DMEM、血清、抗生剤、その他

## VII. 操作方法

※本製品は【継代可能】です。

### 細胞解凍・播種

※下記は、100 mm dish で培養する場合のプロトコールになります。

#### 【準備するもの】

- ・細胞培養用 100mm dish
- ・マウスシュワン細胞株 (IMS32) 用メディアウム

1. 凍結細胞のバイアルを、37℃温水にて2分間加温して解凍してください。
2. 解凍した細胞液は、予め室温に戻したメディアウム 10 mL が入っている 50 mL 遠沈管に移し混和した後、遠沈管内のメディアウムを 1 mL 分取し、バイアルを共洗いして細胞液を回収してください。
3. 細胞懸濁液を全量、細胞培養用 100mm dish (播種密度：約  $0.9 \times 10^4$  cells/cm<sup>2</sup>) に播種し、5%CO<sub>2</sub> 存在下の 37℃インキュベーターで培養してください。

※ 解凍後の遠心洗浄による細胞へのダメージは、細胞凍結液の残存によるダメージよりも大きく、細胞の接着や増殖が悪くなる場合がありますので、遠心洗浄を行わないで播種されることをお勧め致します。

4. 培地交換は 37℃に加温したメディアウムを用いて、播種後翌日に1回、その後は1週間に2、3回の頻度でおこなってください。

※播種してから 3~5 日後に 80~100%コンフルエントになります。

※IMS32 はガラス面への接着が非常に悪いため、ガラス面で培養する場合は、コラーゲンもしくは poly-L-lysine でガラス表面をコーティングしてから、培養を行ってください。なお、コラーゲン等でコーティングを行っても、接着・増殖は通常の培養状態より低下します。

### 細胞継代

#### 【準備するもの】

- ・70~90%コンフルエントになった細胞
- ・マウスシュワン細胞株 (IMS32) 用メディアウム

1. 70~90%コンフルエントになった細胞を用意してください。
2. 上清を除去し、37℃に加温した培養用メディアウムを 10~12mL 添加してください。
3. ピペッティングを行い、細胞を剥離してください。



※ピペッティング後、細胞が剥離できているかどうかを顕微鏡下で確認してください。ピペッティングが不十分だと相当量の細胞が剥離できず、増殖に影響が出ることがあります。

4. 剥離した細胞を 50mL 遠沈管に回収し、細胞懸濁液としてください。
5. 細胞懸濁液とメEDIUMを 1 : 3~1 : 4 の割合で混合し、新しい培養容器に播種してください。
6. 5%CO<sub>2</sub> 存在下の 37°Cインキュベーターで培養してください。細胞が 70~90%コンフルエントになった状態（参照：図 1、C）で同様に継代を行ってください。

#### 凍結ストックの調製

1. 細胞継代方法の 1~4 を行います。
2. 4°C、200 ×g、5 分間遠心後、上清を除去し、COS banker(KOJ 製品コード COS-CFM01) を  $1 \times 10^6$  cells/mL になる様に加えて懸濁します。
3. 凍結保存用チューブに 1mL/チューブで分注し、細胞凍結用コンテナ(BM 機器 製品コード BCS-136 または 同等品)を用いて-80°Cで凍結保存します。
4. 1 日以上-80°Cにて静置後、液体窒素中に移してください。

#### VIII. 技術情報






図1. 蛍光免疫染色及び位相差顕微鏡画像

- A. 抗 p75 抗体蛍光染色 (緑:p75,青:核染)  
B. 抗 S100 抗体蛍光染色 (緑:S100,青:核染)  
C. 位相差顕微鏡画像  
倍率: X100 (A,B,C)



## IX. 参考文献

- 1) Watabe K, Fukuda T, Tanaka J, et al. Spontaneously immortalized adult mouse Schwann cells secrete autocrine and paracrine growth-promoting activities. *J Neurosci Res.* 1995;41:279-290.
- 2) Watabe K, Sakamoto T, Kawazoe Y, Michikawa M, Miyamoto K, Yamamura T, Saya H, Araki N. Tissue culture methods to study neurological disorders: Establishment of immortalized Schwann cells from murine disease models. *Neuropathology* 2003;23:64-74.

《本製品をご利用になられた文献、発表データ》

本製品をご利用いただき投稿された論文、学会発表パネルなどを送付いただきましたお客様に粗品を進呈させていただきます。ご提供いただきました論文などは、WEBやカタログ、技術資料を通じて多くの研究者の方への技術情報として利用させていただく場合がございます。是非皆様のご協力をお願いいたします。

送付先：〒047-0261 北海道小樽市銭函3丁目513番2

コスモ・バイオ株式会社 札幌事業部 あて郵送

または [primarycell@cosmobio.co.jp](mailto:primarycell@cosmobio.co.jp) あて PDF ファイル送信



コスモ・バイオ株式会社  
COSMO BIO Co., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル  
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619  
TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部（技術的なお問い合わせ）

TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295  
E-mail : [primarycell@cosmobio.co.jp](mailto:primarycell@cosmobio.co.jp)  
URL : <http://www.primarycell.com/>